

## ENFANT ALLAITÉ : MAINTIEN DE L'ALLAITEMENT MATERNEL

### MANIFESTATIONS LÉGÈRES ET RESSENTI MODESTE



EN SAVOIR PLUS, SUR LES PROFILS DE BÉBÉS ?


Scannez le QR code ci-contre



## ENFANT NON ALLAITÉ : CHOISIR UNE FORMULE ADAPTÉE

### Bébé régurgite ?

La régurgitation, contrairement au vomissement se fait sans effort et sans contraction musculaire.




Si présence de symptômes extra-digestifs, renvoyer vers le médecin

### Bébé est inconfortable et semble présenter des coliques ?



Mise en place du cycle nyctéméral : périodes de pleurs entre 18h et 22h

### Bébé est constipé ?




### Bébé a une diarrhée sévère et/ou prolongée (≥ 7 jours) ?

Des selles molles ou liquides, et/ou une augmentation de la fréquence d'évacuation des selles (> 3 selles par 24h)

Si présence d'un terrain atopique (antécédents familiaux d'allergie, dermatite atopique), les signes peuvent être ceux d'une APLV\*\*, renvoyer vers le médecin

### MANIFESTATIONS ET RESSENTIS MODÉRÉS À SÉVÈRES



□. Adam-Darque A, et al., Shedding light on excessive crying in babies. *Pediatr Res.* 2021 Apr;89(5):1239-1244 - \*Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales. À utiliser sous contrôle médical - \*\* APLV : Allergie aux Protéines de Lait de Vache

**AVIS IMPORTANT:** Le lait maternel est l'aliment idéal et naturel du nourrisson: il est le mieux adapté à ses besoins spécifiques. Une bonne alimentation de la mère est importante pour la préparation et la poursuite de l'allaitement au sein. L'allaitement mixte peut gêner l'allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. En cas d'utilisation d'une préparation infantile, lorsque la mère ne peut ou ne souhaite pas allaiter, il importe de respecter scrupuleusement les indications de préparation et d'utilisation et de suivre l'avis du Corps Médical. Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l'enfant. Les implications socio-économiques doivent être prises en considération dans le choix de la méthode d'allaitement.