

# LA DIOSMECTITE

avec le soutien de **THERABEL** 

La diosmectite est une argile naturelle faisant partie de la classe des adsorbants intestinaux. Sa structure en feuillets et sa viscosité élevée lui confèrent un pouvoir couvrant important de la muqueuse digestive. Ceci empêche toutefois le passage des nutriments et peut diminuer l'absorption des autres médicaments pris simultanément.

Ainsi, il est recommandé d'administrer tout autre médicament à distance de la diosmectite (voir interactions).

La diosmectite présente une **action plus lente que le lopéramide**.

## INDICATIONS

**Adulte et enfant de plus de 2 ans.** Selon l'âge, 4 à 6 sachets dosés à 3 g de diosmectite par jour.  
**La durée du traitement est limitée à 3 jours.**

**Attention, depuis septembre 2018, la diosmectite n'a plus d'indication chez l'enfant de moins de 2 ans.**

## EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS

Le plus fréquent est :

- Constipation

Sont également rapportés :

- Eruptions cutanées
- Vomissements

## PRINCIPALES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**À utiliser avec prudence** chez les patients présentant des antécédents de constipation chronique sévère.

**A noter : À déconseiller** aux patients présentant une intolérance au fructose ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/ isomaltase. Ce médicament contenant de petites quantités d'alcool (éthanol), inférieures à 100 mg par dose journalière, il est nécessaire d'en tenir compte.

**Interactions médicamenteuses :** la diosmectite pouvant diminuer l'absorption des médicaments pris simultanément, **un délai d'au moins 2 heures est recommandé entre la prise de diosmectite et de toute autre médication.**

## Sources :

- Monographies des médicaments : [www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr](http://www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)