

LE RACÉCADOTRIL

avec le soutien de THERABEL 

Le racécadotril est un antidiarrhéique antisécrétoire « pur », inhibiteur de l'enképhalinase intestinale (Enzyme dégradant les enképhalines qui, par leur action sur les récepteurs opioïdes, favorisent la réabsorption de l'eau et des électrolytes).

Ne modifiant pas le transit, il n'entraîne pas de risque de constipation secondaire ni de stase de l'agent pathogène au niveau intestinal.

INDICATIONS

Adulte et enfant de plus de 15 ans. Posologie initiale de 100 mg, quel que soit le moment de prise, puis 100 mg au début des 3 principaux repas. **La durée du traitement est limitée à 3 jours.**

EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS

Le plus fréquent est :

- Céphalées

Peuvent survenir :

- Des affections de la peau de type rash cutanés ou erythèmes

Plus rarement :

- Réactions sévères incluant des angio-œdèmes

PRINCIPALES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser en cas de fièvre ou en présence de sang ou de glaires dans les selles, ni en cas de diarrhée associée aux antibiotiques (faute d'évaluation dans ce contexte). **A utiliser avec prudence** chez des patients ayant une insuffisance hépatique ou rénale.

A noter : à déconseiller aux patients ayant un déficit en lactase et chez ceux intolérants au galactose ou présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du lactose.

Interactions médicamenteuses : l'association à d'autres médicaments pouvant être à l'origine d'angio-œdèmes, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), est déconseillée

Sources :

- Monographies des médicaments : www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr